

## **Odběr materiálu na střevní parazity.**

Odběr stolice k vyšetření na střevní parazity se provádí 3x obden, odebírá se vzorek velikosti vlašského ořechu. Současně se stolicí se doporučuje poslat do laboratoře i perianální stěr (tj. stěr z okolí konečníku), který je určen k diagnostice nákazy způsobené roupy (*Enterobius vermicularis*). Pouhé vyšetření stolice je v tomto případě neprůkazné, protože samičky roupů vylézají v noci z konečníku a kladou vajíčka v jeho okolí.

Perianální stěr se provádí 3x obden. Stěr z okolí konečníku se provede pomocí lepexové či jiné průhledné lepící pásky nalepené na sklíčko následujícím způsobem:

Páska nalepená na sklíčko se ze 2/3 odlepí a lepivá část se přitlačí na řitní otvor kolmo na rýhu mezi hýžděmi. Vyšetřovaný před přiložením pásky hýždě od sebe odtáhne, po nalepení je k sobě stlačí na 30 vteřin a opět odtáhne. Páska s otiskem se opět přilepí ke sklíčku. Pacienti si nesmí dva dny před stěrem umývat konečník.

Odběrové zkumavky i perianální stěry je možno vyzvednout na oddělení parazitologie, nebo je spolupracujícím lékařům zdarma na požádání posíláme.

Odebraný materiál je nutno popsat jménem pacienta, datem odběru a uložit v lednici při 4°C. Vzorky je třeba doručit do laboratoře spolu s průvodkou či doporučením od ošetřujícího lékaře co nejdříve po odběru posledního vzorku.