

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Stanice pylové informační služby Karlovy Vary

14. týden Početní převahu si stále ve vzduchu udržují pylová zrna olše. Oproti minulému období vzrostlo zastoupení méně alergologicky významného pylu topolu a vrby. Stále se vyskytují pylová zrna dřevin z čeledi cypřišovitých a pylová zrna tisu. Rovněž pyl lísky je ve vzduchu stále rozptýlen, bude však již mizet. Zatím ojediněle se nově objevují pylová zrna dalších dřevin, které rozkvétají v jarním období – javor, jasan, jilm a také i bříza. Nadcházející období bude obdobné, pylové spektrum bude bohatší a bude se zvyšovat množství velmi alergizujících pylových zrn břízy.

tabulka počtu pylových zrn a spor v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
javor	0	0	1	0	0	0	0	1
olše	62	106	102	20	32	57	0	379
bříza	0	0	0	0	0	1	0	1
líška	8	9	5	0	7	11	1	41
cypřišovité	2	12	43	12	1	7	1	78
jasan	0	0	0	0	0	1	0	1
topol	3	34	49	33	20	35	0	174
vrba	2	12	7	11	12	47	0	91
tis	1	9	7	7	3	5	0	32
jilm	0	0	0	0	1	4	0	5
Alternaria	0	1	0	0	2	1	0	4
Cladosporium	63	56	35	93	52	36	0	335
Epicoccum	0	0	1	0	0	1	0	2

