

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

14. týden Spektrum pylových zrn je velmi bohaté, pyl začíná uvolňovat většina na jaře kvetoucích dřevin. **Rozvíjí se pylová sezóna břízy, tato pylová zrna jsou hlavní příčinou současných alergických obtíží.** Větší zastoupení pylových zrn jasanu by mělo mít pro alergiky spíše střední význam. Příští období bude velmi podobné, pylu topolu ubývá, naopak více bude pylových zrn břízy a objeví se častěji pylová zrna dalších postupně rozkvétajících dřevin. Nadále lze očekávat vysokou koncentraci pylu ve vzduchu, která bude velmi kolísat v závislosti na počasí.

Tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
bříza	5	20	46	17	110	5	13	216
cypřišovitě	10	6	8	2	21	20	23	90
dub	0	0	0	0	0	0	1	1
habr	0	1	2	2	5	0	3	13
jasan	9	17	23	11	28	5	15	108
jilm	0	0	1	0	1	1	1	4
modřín	0	0	0	0	0	3	0	3
olše	1	1	1	0	1	3	6	13
sítinovitě	0	1	0	0	1	0	0	2
šáchorovitě	0	1	0	0	0	0	0	1
tis	7	1	4	1	1	7	4	25
topol	6	4	4	0	2	7	12	35
vrba	7	29	11	0	13	13	11	84
Alternaria	1	1	0	0	0	1	2	5
Cladosporium	4	14	22	15	48	15	18	136

