

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Stanice pylové informační služby Ústí nad Labem

Koncentrace silně alergenního pylu břízy oproti minulému týdnu poklesla. Pyl břízy je hlavní příčinou polinózy v jarních měsících. Význačná je zkřížená reaktivita pylu břízy s pylem dalších dřevin (habru, topolu, jilmu, dubu nebo buku). Dále klesá množství pylu javoru, habru, tisu i jasanu. Naopak začíná pylová sezóna dubu, postupně se budou přidávat buky, jehličnany a trávy. Aktuální pylová situace bude záviset na počasí, především na četnosti srážek, které vzduch na přechodnou dobu vyčistí od pylových partikulí. Koncentrace spor vzdušných plísní vzrostla, převládají Cladosporia.

CZULAB	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
javor	2	11	5	3	1	1	3	26
Hvězdicovité	0	0	0	0	0	0	1	1
bříza	126	140	104	11	24	31	85	521
habr	5	13	3	0	3	2	12	38
cypřišovitě	0	1	1	0	0	0	0	2
buk	0	1	0	0	0	1	3	5
jasan	5	44	17	6	8	14	31	125
smrk	0	1	0	0	0	0	0	1
borovice	0	1	1	0	0	0	0	2
jitrocel	1	0	0	0	2	0	0	3
platan	0	4	5	1	0	1	21	32
topol	0	4	2	1	2	0	10	19
dub	10	16	3	3	14	10	23	79
šťovík	0	0	0	0	0	0	1	1
vrba	3	1	31	1	6	3	11	56
tis	1	0	3	1	6	0	4	15
Alternarie	5	6	6	2	2	4	8	33
Cladosporium	115	133	60	38	53	93	263	755
Epiccocum	0	2	1	1	0	1	2	7
Helminthosporium	4	2	6	2	23	4	14	55

