

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

Klíšťová encefalitida nebo také klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění. Původcem je **virus klíšťové encefalidity** napadající nervový systém. Na člověka se přenáší ze zvířat, především infikovaným klíštětem. Méně často dochází k nakažení konzumací syrového mléka nebo nepasterizovaných mléčných výrobků. Nakažená klíšťata v různých vývojových stádiích se vyskytují ve všech krajích České republiky, aktivní jsou v období od jara až do podzimu. Onemocnění probíhá většinou dvoufázově. První fáze trvá cca 3-5 dní, projeví se bolestí svalů, kloubů, zvýšenou teplotou, bolestí hlavy a únavou. Po krátkém období určitého zlepšení může přijít druhá fáze onemocnění, kdy se objeví vysoké horečky, ztuhlost šíje, silné bolesti hlavy a zvracení. Dochází k poškození centrálního nervového systému s projevy nervové obrny, ztuhnutí svalů, třesem, závratěmi, poruchami paměti, spánku, dezorientací. Akutní stav onemocnění trvá 2 – 3 týdny. 2. fáze onemocnění může zanechat trvalé následky např. chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, třes a poruchy rovnováhy, obrna svalů v obličeji, obrny končetin, atd. Klíšťovou encefalidou ročně v ČR onemocní 400 – 600 osob.

Název očkovací látky: **Encepur pro dospělé**

 FSME-IMMUN 0,5 ml pro dospělé

 Encepur pro děti

 FSME-IMMUN 0,25 ml pro děti

Ceny očkování zahrnují i poplatek za aplikaci vakcíny a jsou konečné.

Ceny najdete v ceníku očkování – [zde](#)