

# Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

**12. týden** Spektrum pylových zrn je celkem bohaté, převahu mají stále pylová zrna olše. Větší množství také zaznamenává málo alergizující pyl cypřišovitých a tisů. Doznívá výskyt pylu lísky. Pyl jilmu může způsobovat alergickou reakci v kombinaci s pylem topolu, vrby, břízy a jasanu, samostatně nepříjemnost nepředstavuje. Vysoce alergizující pylová zrna břízy se zatím objevují ojediněle, plný rozkvet nastane již brzy v závislosti na aktuálním počasí. Předpovídané poměrně značné ochlazení rozkvet jarních dřevin poněkud zpomalí.

Tabulka počtu sporomorf v m<sup>3</sup> vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
bříza	5	7	5	2	0	0	0	19
cypřišovité	9	9	16	23	8	1	8	74
habr	0	2	1	0	0	0	0	3
jasan	1	0	1	0	0	0	0	2
jilm	3	3	8	22	3	1	12	52
líška	8	19	33	1	1	0	1	63
modřín	0	0	0	0	0	3	0	3
olše	37	47	47	40	15	9	9	204
tis	13	34	49	11	2	0	3	112
topol	7	8	6	3	2	1	3	30
vrba	11	18	11	3	3	0	4	50
zlatice	0	0	0	0	1	0	0	1
Alternaria	1	2	1	1	3	0	0	8
Cladosporium	2	11	6	0	3	1	0	23
Epicoccum	0	1	0	1	1	0	1	4

