

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Stanice pylové informační služby Karlovy Vary

9. týden Pylových zrn lísky ve vzduchu ubývá, naopak více je málo alergizujícího pylu topolu a cypřišovitých a také tis. Převahu ale stále mají pylová zrna olše, která budou dominantní i v nadcházejícím období. Spolu s oteplováním bude docházet k rozkvétání dalších druhů, nejsilnější jarní pylový alergen – pylová zrna břízy se začnou ve větším množství uvolňovat z jehněd nejspíše ke konci měsíce března.

Tabulka počtu pylových zrn a spor v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
borovice	1	0	0	0	0	0	0	1
břída	0	1	0	0	0	1	0	2
cypřišovité	1	3	1	0	3	3	0	11
líška	6	3	0	2	1	3	0	15
olše	154	46	444	256	105	77	1	1083
smrk	1	0	0	0	0	0	0	1
tis	0	0	0	1	1	0	0	2
topol	3	0	0	1	4	2	0	10
Alternaria	0	0	0	1	0	0	0	1
Cladosporium	8	4	0	3	5	0	0	20

