

MENINGOKOKOVÉ INFEKCE

Meningokokové infekce jsou závažná bakteriální onemocnění způsobující zánět mozkových blan (tzv. hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (tzv. sepsi). Nemoc mívá často rychlý průběh, kdy v krátké době čítající několik hodin, může dojít k selhání organismu ohrožujícímu život. Zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo bacilonosič. Původcem onemocnění je bakterie **Neisseria meningitidis** různých séro skupin. Bakterie se přenáší kapénkovou cestou např. při mluvení, kašlání či kýchání. Onemocnění začíná náhle vysokou horečkou, silnými bolestmi hlavy a kloubů. Po těchto příznacích může následovat náhlý nástup ospalosti a ztuhnutí šíje. Na kůži se mohou vytvořit červené skvrnky, které neustále přibývají. Komplikace meningokokového onemocnění mohou zahrnovat ztrátu sluchu, slepotu, epilepsii a trvalé poškození mozku. U 10 – 15 % nemocných má infekce extrémně závažný průběh končící úmrtím v krátké době po začátku onemocnění. V nejhorších případech vede toto onemocnění k úmrtí. Nejohroženějšími věkovými skupinami jsou děti do 5 let a mladí lidé ve věku 15-25 let.

Název očkovací látky:	Menveo (séro skupiny A+C+W135+Y)
	Nimenrix (séro skupiny A+C+W135+Y)
	MenQuadfi (séro skupiny A+C+W135+Y)
	Bexsero (séro skupina B)
	Trumenba (séro skupina B)

Ceny očkování zahrnují i poplatek za aplikaci vakcíny a jsou konečné.

Ceny najdete v ceníku očkování – [zde](#)

