

RSV (respirační syncytiální virus)

RSV je původcem vysoce nakažlivého onemocnění. Způsobuje infekce dýchacích cest a plic.

Těžší průběhy vidíme zejména u kojenců mladších 6 měsíců a starších dospělých.

RSV infekce mají typicky sezónní charakter - přibývají během podzimu, vrcholí v zimě a postupně ubývají s příchodem jara. Virus se šíří v podobě kapének se sekrety dýchacích cest při kašli nebo kýcháním nemocné osoby. Kapénky se mohou usazovat i na předmětech, kterých se lidé dotýkají - např. kliky dveří (virus zde přežívá až 6 hodin).

Příznaky RSV infekcí jsou podobné jako u řady běžných infekcí dýchacích cest - horečka, rýma, kašel, bolest v krku, celková schvácenost. Vysoké riziko závažného průběhu onemocnění (záněty průdušek a plic) mají nedonošené děti a kojenci a dále starší dospělí s onemocněním srdce a plic, kdy může dojít ke zhoršení chronického onemocnění a dlouhodobému oslabení organismu.

Po prodělání onemocnění vzniká jen krátkodobá imunita, proto jsou opětovné infekce časté.

Prevence:

- dodržování základních hygienických pravidel (mytí rukou mýdlem a vodou před jídlem, nesdílet skleničky, příbory apod., v případě nemoci nechodit do kolektivu)

Očkování:

- vakcína je určena k získání ochrany zejména proti onemocnění dolních cest dýchacích způsobeného RSV u dospělých ve věku 60 let a starších

Název očkovací látky:

**Arexvy
Abrysvo**

Ceny očkování zahrnují i poplatek za aplikaci vakcíny a jsou konečné.

Ceny najdete v ceníku očkování – [zde](#)